

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ГКИ на ПХВ "Городская поликлиника №6"
 акимата г.Астаны
 Д.С. Байсеркина
 2023г.

Объявление №1 (закуп на 2024 год)

о проведении закупки способом запроса ценовых предложений в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила) в ГКИ на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны

ГКИ на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны, 010000, г.Астана, ул.Аманат, 3, (электронный адрес: robastapa@yandex.kz), объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, по следующим позициям:

№ лота	Наименование ИМН	Краткая характеристика ИМН	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тг	Сумма, тг
1	Диагностический набор реагентов для определения Аланинаминотрансферазы R1: не менее 4 флакона по 35мл+ R2: не менее 2 флакона по 18мл.	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактнтной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 660 исследований	набор	40	19 280,00	771 200,00
2	Диагностический набор реагентов для определения Альбумин, не менее 4 флакона по 40 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Альбумина ALB в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактнтной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Реагент должен быть совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 964 исследований	набор	5	15 000,00	75 000,00

3	Диагностический набор реагентов для определения Аспартатаминотрансферазы R1: не менее флакона 4 по 35мл + R2: не менее флакона 2 по 18мл.	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Аспартатаминотрансферазы GOT/AST в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 660 исследований.	набор	40	19 280,00	771 200,00
4	Диагностический набор реагентов для определения Билирубина общего R1: не менее 4 флакона по 35+ R2: не менее 2 флакона по 18мл.	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Билирубина общего TBIL/VOX в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 610 исследований.	набор	50	30 500,00	1 525 000,00
5	Диагностический набор реагентов для определения Билирубина прямого R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее 2 по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Билирубина прямого DBIL/VOX в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 610 исследований.	набор	30	30 500,00	915 000,00

6	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы R1: не менее 4 флакона по 40 мл + R2: не менее 2 флакона по 20 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Глюкозы GLU-CodPar в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор рассчитан на не менее 822 исследований	набор	60	16 950,00	1 017 000,00
7	Диагностический набор реагентов для определения Креатинин R1: не менее 2 флакона по 27 мл + R2: 1 флакона по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Креатинина CREA-S в сыворотке крови. Саркозиноксидный метод. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 392 исследований	набор	65	20 200,00	1 313 000,00

8	Диагностический набор реагентов для определения Магния, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения магния (Mg) в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должны быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 728 исследований	набор	10,0	20 090,00	200 900,00
9	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее 2 флакона по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Мочевины BUN/UREA в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 600 исследований	набор	35	16 990,00	594 650,00

10	Диагностический набор реагентов для определения общего белка, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения общего белка (TP) в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 1428 исследований	набор	11	13 680,00	150 480,00
11	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения Общего холестерина CHOL/TC в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 728 исследований	набор	25	21 240,00	531 000,00

12	Диагностический набор реагентов для определения Триглицериды, не менее 4 флакона по 40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения Триглицериды (TG) в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 728 исследований	набор	5	35 500,00	177 500,00
13	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-амилазы R1: 1 флакон по 38 мл + R2: 1 флакон по 10 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Альфа-амилазы AMS в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 154 исследований	набор	10	26 740,00	267 400,00
14	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансфераза, R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее 2 флакона по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы GGT в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 660 исследований	Набор	8	26 500,00	212 000,00

15	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты R1: не менее 4 флакона по 40 мл + R2: не менее флакона 2 по 20 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Мочевой кислоты UA в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 698 исследований	Набор	5	22 500,00	112 500,00
16	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы R1: не менее 4 флакона по 35 мл + R2: не менее флакона 2 по 18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы ALP в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 600 исследований	Набор	12	16 290,00	195 480,00
17	Диагностический набор реагентов для определения Железа R1: не менее 2 флакона по 40 мл + R2: 1 флакон по 16 мл + калибратор 1 флакон по 1,5 мл + контроль 1 флакон по 5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Железа FE в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2 + калибратор 1x1,5 мл+ контроль 1x5 мл, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 483 исследований	Набор	20	28 800,00	576 000,00

18	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов высокой плотности HDL-C R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения в сыворотке крови липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 227 исследований	Набор	16	43 980,00	703 680,00
19	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидов Низкой плотности LDL-C R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения в сыворотке крови липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 227 исследований	Набор	25	56 200,00	1 405 000,00
20	Калибратор Липидов, не менее 5 флаконов по 1 мл (HDL-C,LDLC)	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430.	Набор	1	85 420,00	85 420,00

21	Мультикалибратор не менее 10 флаконов по 3 мл	Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT; GOT/AST; ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	1	116 800,00	116 800,00
22	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, не менее 6 флаконов по 5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (N) для определяемых аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	3	158 400,00	475 200,00
23	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, не менее 6 флаконов по 5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (P) для определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	3	158 400,00	475 200,00

24	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 10 мл.	Двухкомпонентный набор реагентов для определения С-реактивного белка CRP в сыворотке крови методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Набор должен быть рассчитан на не менее 154 исследований. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	Набор	28	40 000,00	1 120 000,00
25	Калибратор специфических белков, не менее 5 флаконов по 1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM)	Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	упаковка	1	116 600,00	116 600,00
26	Диагностический набор реагентов для определения Д-Димер (1 флакон по 40 мл+1 флакон по 15 мл)	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Д-Димер в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью оригинальной контрольной плазмы. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 202 исследований	набор	1	325 000,00	325 000,00

27	Контроль D-Dimer 1 флакон по 0,5 л., не менее 2 флакона по 0,5 мл.	Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными значениями (N, H) для определяемых аналитов: D-Dimer методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 1мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	набор	1	100 000,00	100 000,00
28	Детергент мощный раствор, не менее 1 литра.	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления мощного раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров мощного раствора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430	флакон	100	33 000,00	3 300 000,00
29	Диагностический набор реагентов для определения Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 40 мл + Calibrator 1 флакон по 0,5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Антистрептолизина О II ASO в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 80мл + Calibrator 1x0.5 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 300 исследований.	набор	8	131 300,00	1 050 400,00
30	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора II с калибратором R1: 1 флакон по 40 мл + R2: 1 флакон по 11 мл + Calibrator не менее 5 флаконов по 0,5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора II RF в сыворотке крови. Объем рабочего раствора не менее 51мл + Calibrator 5x0.5 мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не должно требоваться повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS430. Набор должен быть рассчитан на не менее 202 исследований.	набор	8	110 170,00	881 360,00

31	ТриплКонтроль L: не менее 3 флакона по 1 мл; H: не менее 3 флакона по 1 мл (ASO/CRP/RF)	Лифофильно высушенная плазма для проведения контроля качества QC, с аттестованными значениями (N, H) для определяемых анализов: ASO/CRP/RF методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 1мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS240/BS240Pro/BS-430	набор	1	182 000,00	182 000,00
32	Лизирующий реагент M-30CFL не мене 500 мл	Для автоматизированного гематологического анализатора BC-30S. Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-30S. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	30	31 400,00	942 000,00
33	Дилуэнт M-30D, не менее 20 л	Для автоматизированного гематологического анализатора BC-30S. Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-30S. Объем упаковки не менее 20 литров	канистра	50	47 000,00	2 350 000,00
34	Контрольная кровь B-30, не менее 3 флакона по 3 мл. Tri-rack (1L, 1N, 1H)	Для автоматизированного гематологического анализатора BC-30S. Набор марки B30 предназначен для ежедневного проведения внутри лабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3 мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы BC-30S для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	6	75 000,00	450 000,00
35	Бумага для термопринтера	Бумага для термопринтера 50x20x12 нар. Ч, для автоматизированного гематологического анализатора BC30S	шт.	10	550,00	5 500,00

36	Лизирующий реагент M-58LEO (I), 1000 мл.	Специальный жидкий реагент марки M-58 LEO I LYSE, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для автоматического гематологического анализатора BC 5800. Объем флакона не менее 1000мл.	флакон	30	36 400,00	1 092 000,00
37	Лизирующий реагент M-58LEO (II), не менее 500мл.	Специальный жидкий реагент марки M-58 LEO II LYSE, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для автоматического гематологического анализатора BC 5800. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	12	25 750,00	309 000,00
38	Лизирующий реагент M-58 LH, не менее 500 мл.	Специальный жидкий реагент марки M-58 LH LYSE, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для автоматического гематологического анализатора BC 5800. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	90	20 200,00	1 818 000,00
39	Лизирующий реагент M-58 LBA, не менее 1000 мл.	Специальный жидкий реагент марки M-58 LBA LYSE, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для автоматического гематологического анализатора BC 5800. Объем флакона не менее 1000мл.	флакон	78	36 400,00	2 839 200,00
40	Чистящий раствор, не менее 50мл.	Универсальный чистящий раствор (реагент) M30 P, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки для автоматического гематологического анализатора BC 5800.	флакон	50	6 540,00	327 000,00

41	QC (контрольная кровь) B55 (L,N,H), не менее 3 флакона по 3,5мл	Набор марки B55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для автоматического гематологического анализатора BC 5800 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	6	90 000,00	540 000,00
42	Диагностический набор реагентов для определения протромбинового времени, не менее 10 флаконов по 4мл.	Реагент протромбиновое время, не менее 10 флаконов по 4мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	45	41 000,00	1 845 000,00
43	Диагностический набор реагентов для определения АПТВ, АРТТ, не менее 10 флаконов по 2 мл	Диагностический набор реагентов для определения АПТВ, АРТТ, не менее 10 флаконов по 2 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	30	29 300,00	879 000,00
44	Диагностический набор реагентов для определения Фибриногена, не менее 6 флаконов по 4 мл + 1 флакона по 1 мл cal + не менее 2 флакона по 75 мл.	Диагностический набор реагентов для определения Фибриногена, не менее 6 флаконов по 4 мл + 1 флакона по 1 мл cal + не менее 2 флакона по 75 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	35	110 000,00	3 850 000,00
45	Диагностический набор реагентов для определения тромбинового времени, не менее 10 флаконов по 2мл	Диагностический набор реагентов для определения тромбинового времени, не менее 10 флаконов по 2мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	15	20 320,00	304 800,00
46	Реагент раствор кальция хлорид, не менее 10 флаконов по 4 мл.	Реагент раствор кальция хлорид, не менее 10 флаконов по 4 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	15	12 750,00	191 250,00
47	Промывочный раствор -1, не менее 10 флаконов по 15 мл	Промывочный раствор -1, не менее 10 флаконов по 15 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	набор	12	26 400,00	316 800,00
48	Промывочный раствор -2, не менее 10 по 2500 мл	Промывочный раствор -2, не менее 10 по 2500 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра C3100	штук	45	67 900,00	3 055 500,00

49	Контрольная плазма - 1, не менее 10 флаконов по 1 мл.	Контрольная плазма - 1, не менее 10 флаконов по 1 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра С3100	набор	4	89 000,00	356 000,00
50	Контрольная плазма - 2, не менее 10 флаконов по 1 мл.	Контрольная плазма - 2, не менее 10 флаконов по 1 мл. Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для автоматического анализатора-коагулометра С3100	набор	4	89 000,00	356 000,00
51	Магнитная мешалка для автоматического анализатора-коагулометра С3100	Магнитная мешалка - магнитный цилиндр размером 2*7мм для многообразового использования в закрытой системе коагулометра С3100.	шт.	1	30 000,00	30 000,00
52	Наборы реагентов для определения гликолизированного гемоглобина (HbA1c).	Набор реагентов для определения гликолизированного гемоглобина в крови (HbA1c) должен состоять из: Элюент А – не менее 2 флакона по 800 мл. Должен использоваться для элюирования HbA1a, HbA1b и HbF, с малым положительным зарядом. Элюент В – 1 флакона по 700 мл. Должен использоваться для элюирования LA1c и HbA1c со средним положительным зарядом. Элюент С – 1 флакон по 800 мл. должен использоваться для элюирования HbA0 с высоким положительным зарядом. L-гемолитический агент – 1 по флакон 5000 мл. Должен использоваться для лизиса эритроцитов крови и высвобождения гликолизированного гемоглобина. Набор реагентов должен быть функционально совместим с анализатором гликированного гемоглобина H8 (HPLC) закрытая система.	набор	30	158 200,00	4 746 000,00
53	Калибратор реагента гликолизированного гемоглобина HbA1c.	Набор калибратора реагента гликолизированного гемоглобина HbA1c должен иметь тип продукта цельной крови, применяемый для калибровки анализатора гликированного гемоглобина H8 (HPLC) закрытая система и обеспечивать достоверность результатов тестирования. Набор должен состоять из Калибратора HbA1c (Уровень 1) не менее 1 флакона по 0,01 мл и Калибратора HbA1c (Уровень 2) не менее 1 флакона по 0,01 мл. Набор калибратора должен быть функционально совместим с анализатором гликированного гемоглобина H8 (HPLC) закрытая система.	набор	2	76 900,00	153 800,00

54	Контрольный материал гликолизированного гемоглобина HbA1c	Набор контрольного материала гликолизированного гемоглобина HbA1c должен иметь тип продукта цельной крови, применяемый для проверки функции элюирования анализатора гликолизированного гемоглобина H8 (HPLC) закрытая система. Набор должен состоять из контрольного материала высокого уровня 1 флакона по 1 мл. и контрольного материала низкого уровня не менее 1 флакона по 1 мл. Ежедневный запуск программы контроля качества должен позволять определять достоверность анализатора гликолизированного гемоглобина H8 и обеспечивать достоверность результатов тестирования. Набор контрольного материала гликолизированного гемоглобина HbA1c должен быть функционально совместим с анализатором гликолизированного гемоглобина H8 (HPLC) закрытая система.	набор	4	76 900,00	307 600,00
55	Хроматографическая колонка	Хроматографическая колонка должна содержать катионообменную смолу для адсорбции гликолизированного гемоглобина. При увеличении концентрации элюента будут элюироваться HbA1a, HbA1b, HbF, HbA1c, HbA0.	штука	4	440 700,00	1 762 800,00
56	Диагностический набор реагентов для определения гормона стимулирующего щитовидную железу (TSH), не менее 2 картриджа по 50 мл.	Набор реагентов для определения гормона стимулирующего щитовидную железу (TSH) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора CL-1000i.	набор	80	58 900,00	4 712 000,00
57	Калибратор стимулирующий щитовидную железу гормон (TSH), не менее 3 картриджа по 2 мл.	Набор калибраторов стимулирующий щитовидную железу гормон (TSH) не менее 3 картриджа по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	3	25 700,00	77 100,00
58	Диагностический набор реагентов для определения свободного тироксина (FT4), не менее 2 картриджа по 50 мл.	Набор реагентов для определения свободного тироксина (FT4). В состав набора должны входить: Реагент для определения свободного тироксина – не менее 2 картриджа по 50мл., (определений). Набор реагентов должен быть функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. Каждый картридж должен содержать штрих-код.	набор	60	58 900,00	3 534 000,00
59	Калибратор свободного тироксина (FT4), не менее 3 картриджа по 2 мл.	Набор калибраторов для проведения калибровки свободного тироксина. Набор калибраторов должен быть функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. В состав набора должно входить: не менее 3 картриджа по 2 мл. Упаковка должна иметь оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора.	набор	3	25 700,00	77 100,00

60	Мультиконтроль функций щитовидной железы (L), не менее 6 картриджа по 5 мл.	Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (TSH, FT4, FT3). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	3	228 800,00	686 400,00
61	Мультиконтроль функций щитовидной железы (H), не менее 6 картриджа по 5 мл.	Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (H) для определяемых аналитов (TSH, FT4, FT3). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	3	228 800,00	686 400,00
62	Диагностический набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона (FSH), не менее 2 картриджа по 50мл.	Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) должен состоять из не менее 2 картриджей по 50 (мл) определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора.	набор	12	58 900,00	706 800,00
63	Набор калибратора фолликулостимулирующего гормона (FSH), не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора фолликулостимулирующего гормона (FSH) должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	44 700,00	89 400,00
64	Набор реагентов лютеинизирующий гормон (LH), не менее 2 картриджа по 50мл.	Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона (LH) должно входить: Реагент для определения лютеинизирующей гормона –не менее 2 картриджа по 50 (мл.) определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i.	набор	12	58 900,00	706 800,00
65	Калибратор LH, не менее 3 картриджа по 2 мл.	Набор калибратора LH состоит из не менее 3 картриджа по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	44 700,00	89 400,00

66	Диагностический набор реагентов для определения Пролактина (PRL), не менее 2 картриджа по 50мл.	Набор реагентов для определения Пролактина (PRL) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	18	58 900,00	1 060 200,00
67	Калибратор пролактина (PRL), не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора пролактина (PRL) должен состоять из 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	44 700,00	89 400,00
68	Диагностический набор реагентов для определения Эстрадиола (E2), не менее 2 картриджа по 50 мл.	Набор реагента эстрадиола E2 должен состоять из не менее двух картриджей по 50 определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	10	65 515,00	655 150,00
69	Калибратор эстрадиола (E2), не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора эстрадиола (E2) должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	44 700,00	89 400,00
70	Диагностический набор реагентов для определения Прогестерона, не менее 2 картриджа по 50мл	Набор реагента прогестерона (CLIA) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	5	58 900,00	294 500,00
71	Калибратор прогестерона (PROG), не менее 3 картриджа по 2мл	Калибратор прогестерона PROG должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	44 700,00	89 400,00
72	Мультиконтроль репродуктивный (L), не менее 6 картриджей по 5мл.	Набор мультиконтроля репродуктивного (L) должен состоять из не менее 6 картриджей по 5мл.	набор	2	281 200,00	562 400,00
73	Мультиконтроль репродуктивный (H), не менее 6 картриджей по 5мл.	Набор мультиконтроля репродуктивного (H) должен состоять из не менее 6 картриджей по 5мл.	набор	2	281 200,00	562 400,00

74	Диагностический набор реагентов для определения Инсулина T/Kit, не менее 2 картриджа по 50мл.	Набор реагента инсулина T/Kit должен состоять из не менее двух картриджей по 50(мл.) определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реангентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	10	165 000,00	1 650 000,00
75	Калибратор инсулина, не менее 3 картриджа по 2мл	Набор калибратора инсулина должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	2	67 000,00	134 000,00
76	Диагностический набор реагентов для определения С-пептид (C-peptide), не менее 2 картриджа по 50мл.	Набор реагента С-пептид (C-peptide) должен состоять из не менее двух картриджей по 50 определений. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реангентной карусели хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	5	188 595,00	942 975,00
77	Калибратор С-PEPTIDE, не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора реагента С-пептид С-PEPTIDE должен содержать не менее 3 картриджа по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	67 000,00	134 000,00
78	Мультитест-контроль иммуноанализа (L), не менее 6 картриджа по 2мл.	Набор мультитест-контроля иммуноанализа (L) должен состоять из не менее 6 картриджа по 2мл.	набор	2	107 100,00	214 200,00
79	Мультитест-контроль иммуноанализа (H), не менее 6 картриджа по 2мл.	Набор мультитест-контроля иммуноанализа (H) должен состоять из не менее 6 картриджа по 2мл.	набор	2	133 900,00	267 800,00
80	Калибратор ферритина (Ferritin), не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора ферритина (Ferritin) должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	3	61 400,00	184 200,00

81	Калибратор реагента фолат (Folate), не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора реагента фолат (Folate) должен состоять из не менее 3 картриджа по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	3	29 100,00	87 300,00
82	Калибратор реагента 25-ОН-Витамин D общий (25-OH-Vitamin D Total), не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора реагента 25-ОН-Витамин D общий (25-OH-Vitamin D Total) должен состоять из не менее 3 картриджей по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	22 400,00	44 800,00
83	Калибратор реагента Витамин В12, не менее 3 картриджа по 2мл.	Набор калибратора реагента Витамин В12 должен состоять из не менее 3 картриджа по 2 мл. с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	2	16 800,00	33 600,00
84	Метаболический мультиконтроль (L), не менее 6 картриджа по 2мл.	Метаболический мультиконтроль (L) должен состоять из не менее 6 картриджа по 2мл.	набор	4	128 600,00	514 400,00
85	Метаболический мультиконтроль (H), не менее 6 картриджа по 2мл.	Метаболический мультиконтроль (H) должен состоять из не менее 6 картриджа по 2мл.	набор	4	128 600,00	514 400,00
86	Диагностический набор реагентов для определения Свободного трийодтиронина (FT3). 2 картриджа по 50 мл.	Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина (FT3). В состав набора входит: Реагент для определения свободного трийодтиронин – 2 картриджа по 50 мл., (определений). Набор реагентов функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. Каждый картридж содержит штрих-код.	набор	60	58 900,00	3 534 000,00
87	Калибратор свободного трийодтиронина (FT3). 3 картриджа по 2 мл.	Набор калибраторов для проведения калибровки свободного трийодтиронина. Набор калибраторов функционально совместим с хемилюминесцентным иммунологическим анализатором CL-1000i. В состав набора входит: 3 картриджа по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора.	набор	3	25 700,00	77 100,00

88	Диагностический набор реагентов для определения Антител к пероксидазе щитовидной железы (Anti-TPO), 2 картриджа по 50 мл.	Набор реагентов антитело к пероксидазе щитовидной железы (Anti-TP). В состав набора входит: Реагент для определения антитело к пероксидазе щитовидной железы – 2 картриджа по 50(мл.) определений. Картриджи полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i.	набор	50	128 800,00	6 440 000,00
89	Калибратор Anti-TPO, 3 картриджа по 2 мл.	Набор калибраторов антитело к пероксидазе щитовидной железы (Anti-TP) 3 картриджа по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером хемилюминесцентного иммунологического анализатора CL-1000i, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	3	44 700,00	134 100,00
90	Контроль антигитереомидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO), 6 картриджа по 2 мл.	Контроль антигитереомидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO), 6 картриджа по 2 мл.	набор	3	107 100,00	321 300,00
	Итого:					78 565 645,00

Потенциальный поставщик должен предоставить документы согласно требованиям п.75 Правил.

Объем закупаемого товара неокончательный, Заказчик вправе изменять количество в сторону уменьшения либо увеличения в соответствии с потребностями Заказчика.

Условия поставки: г.Астана, ул.Аманат, 3, оплата по факту поставки товара, способом поставки DDP.

Срок поставки: В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной или электронной Заявки

Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Астана, ул.Аманат, 3, 4 этаж кабинет №439 (отдел гос.закупа, экономист) с 24.11.2023 г. 12.00 часов по 01.12.2023г. 12.00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями г.Астана, ул.Аманат 3, 4 этаж 439 кабинет 01.12.2023 г. время 16.00 часов.

Типовой договор прилагается в Приложении №1 к объявлению №1

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 48-61-70.

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок – менеджер ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны – Никитцова В.В. контактный телефон 8 (7172) 48-61-70, адрес электронной почты polbastana@yandex.kz